

Sixth Grade Immunization Requirements

Washington State law requires that all children attending 6th grade must show proof of:

- **Tetanus, diphtheria, and pertussis (Tdap)** vaccination if he/she is **11 years old** and it has been **five years** since he/she received a tetanus-containing vaccine, like DTaP or a tetanus-diphtheria (Td) booster.
- **Varicella** (chickenpox) vaccination, approximate date of illness, or results from a blood test that show he/she is immune.

Documentation

Your child needs an up-to-date Certificate of Immunization Status (CIS) form (available at your child's school) before the first day of school in fall. Complete the form with Tdap and varicella information as follows:

Tdap	Types of Documentation Allowed
	Date your child received one dose of vaccine, <u>OR</u>
	Philosophical, religious, or medical exemption.
Varicella	Types of Documentation Allowed
	Date your child received one dose of vaccine, <u>OR</u>
	Approximate date or age your child had chickenpox, <u>OR</u>
	Date of blood test showing your child is immune to chickenpox, <u>OR</u>
	Philosophical, religious, or medical exemption

A health check-up that includes vaccinations is recommended for all children age 11-12 years. Schedule your child's check-up appointment at least one month before school starts to make sure they get all of the vaccinations needed for school.

Vaccine and Disease Information

Tetanus, diphtheria, and pertussis (Tdap)

The Tdap vaccine protects teens against tetanus, diphtheria, and pertussis (whooping cough). The vaccine is recommended for all children 11 years and older. Tdap should replace one tetanus booster. Pertussis is a very serious disease that causes coughing spells that make it hard to eat, drink, and even breathe. It can also cause pneumonia, seizures, brain damage, and death.

Varicella (Chickenpox)

Children are required to have one dose of the varicella vaccine to protect against chickenpox. Chickenpox spreads easily and can cause serious skin infections, pneumonia, meningitis, and even death. Even mild cases of chickenpox are uncomfortable; it is difficult to treat itchiness and there is potential for scarring.

Talk to your child's doctor, nurse, or clinic for more information on the Tdap and varicella vaccines, or visit: www.doh.wa.gov/cfh/immunize.

Requisitos para Inmunizaciones

Las leyes del estado de Washington requieren que todos los niños que estén en 6 grado deben tener comprobantes de las siguientes vacunas:

- **Vacuna contra tétano, difteria y tos ferina (Tdap)** si tiene **11 años y han pasado 5 años** desde que se le dió una vacuna de tétano conteniendo DTaP o un refuerzo de tétano-difteria (Td).
- **Vacuna contra Varicela** (chickenpox), día aproximado en que tuvo la enfermedad, o resultados de un exámen de sangre que demuestren que no tiene la enfermedad.

Documentación

Antes de empezar las clases debe pedir en la escuela de su hijo un formulario adonde figuren todas las vacunas actualizadas que estén en el certificado de vacunas. Complete el formulario con la información de la manera siguiente:

Tdap	Tipos de Documentación Permitida
	Fecha en que su hijo recibió una dosis de vacuna, <u>O sino</u>
	Excepción Filosófica, religiosa o médica.
Varicela	Tipos de Documentación Permitida
	Fecha en que su hijo recibió una dosis de vacuna, <u>O sino</u>
	Fecha o edad aproximada en que su hijo tuvo varicela, <u>O sino</u>
	Exámen de sangre que demuestre que no tiene varicela, <u>O sino</u>
	Excepción Filosófica, religiosa o médica.

Se recomienda un exámen de salud completo que incluya vacunación para todos los niños de 11-12 years. En el momento de empezar las clases su niño debe tener todo en regla, por lo tanto haga la cita por lo menos un mes antes.

Información de Vacunas y Enfermedades

Tétano, difteria y tos ferina (Tdap)

La vacuna Tdap protege a niños de contraer tétano, difteria y pertussis (tos ferina). Es recomendada para todos los niños de 11 años o más. Tdap es para reemplazar un refuerzo de la vacuna del tétano. Pertussis (tos ferina) es una enfermedad muy seria que causa ataques de tos y es difícil comer, beber e incluso respirar. También puede causar neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte.

Varicela (Chickenpox)

Se requiere que los niños tengan por lo menos una dosis de la vacuna contra la varicela para estar protegidos. La varicela se disemina fácilmente y puede causar infecciones serias de piel, neumonía, meningitis e incluso la muerte. Aun cuando la varicela es leve causa molestias; tratar la picazón es dificultosa y hay riesgo de que queden cicatrices. Para mas información hable con el pediatra, una enfermera o a una clínica, o visite:

www.doh.wa.gov/cfh/immunize.